



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA  
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E AGRÁRIAS  
DEPARTAMENTO DE AGRÁRIAS E EXATAS  
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS**

**FRANCISCO EDIMILCIO MAIA NETO**

**DIAGNÓSTICO QUANTIQUALITATIVO DO LIXO PATOGÊNICO NO HOSPITAL  
REGIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB**

**CATOLÉ DO ROCHA – PB  
2014**

**FRANCISCO EDIMILCIO MAIA NETO**

**DIAGNÓSTICO QUANTIQUALITATIVO DO LIXO PATOGÊNICO NO HOSPITAL  
REGIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciências Agrárias do Departamento de Agrárias e Exatas da Universidade Estadual da Paraíba, em cumprimento à exigência para obtenção do grau de Licenciado em Ciências Agrárias.

Orientadora: Dr<sup>a</sup> Fabiana Xavier Costa

**CATOLÉ DO ROCHA – PB  
2014**

M217d Maia Neto, Francisco Edimilcio

Diagnóstico quantiqualitativo de lixo patogênico no hospital regional de Catolé do Rocha-PB [manuscrito] : / Francisco Edimilcio Maia Neto. - 2014.

17 p. : il.

Digitado.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Humanas e Agrárias, 2014.

"Orientação: Prof. Dra Fabiana Xavier Costa, Departamento de agrárias e exatas".


1.Meio ambiente. 2.Resíduos sólidos. 3. Contaminação. I.  
Título.

21. ed. CDD 372.357


FRANCISCO EDIMILCIO MAIA NETO

**DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO DO LIXO PATOGENICO DO HOSPITAL  
REGIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB**


Aprovado em 26/02/2014.



**Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Fabiana Xavier Costa** (Orientadora)  
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB  
Centro de Ciências Humanas e Agrárias – CCHA  
Departamento de Agrárias e Exatas - DAE



**Prof. Dr<sup>o</sup>. Raimundo Andrade** (Examinador)  
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB  
Centro de Ciências Humanas e Agrárias – CCHA  
Departamento de Agrárias e Exatas - DAE



**Prof. Msc. Reginaldo Tavares de Melo** (Examinador)  
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB  
Centro de Ciências Humanas e Agrárias – CCHA  
Departamento de Agrárias e Exatas - DAE

# DIAGNÓSTICO QUANTIQUALITATIVO DO LIXO PATOGÊNICO NO HOSPITAL REGIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB

Francisco Edimilcio Maia Neto<sup>1</sup>; Fabiana Xavier Costa<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Licenciatura Plena em Ciências Agrárias, UEPB/Campus IV. Catolé do Rocha-PB.  
E-mail: edimilcio\_maia@hotmail.com

<sup>2</sup>Prof. Dra. do Departamento de Agrárias e Exatas, UEPB/Campus IV, Catolé do Rocha – PB. E-mail:  
fabyxavierster@gmail.com

**RESUMO** - Objetivou-se com este trabalho fazer um levantamento quantiqualitativo do lixo patogênico do Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos localizado na cidade de Catolé do Rocha – PB. A pesquisa foi realizada no período de 01 à 31/05/2012, onde envolveu toda a comunidade hospitalar, tais como: auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnico de raio-x, assistente social, médicos, arquivistas e faturistas, digitadores, fisioterapeutas, nutricionistas, porteiro e maqueiro e auxiliar de serviços gerais e jardineiros, desde a coleta até a pesagem diária destes resíduos que apresenta alto risco para os seres humanos e o meio ambiente. Durante o mês da pesquisa na unidade observou-se enorme preocupação da administração com todos os funcionários, inclusive os que têm acesso ao lixo. A pesagem da primeira semana obteve 228,5 kg, Na segunda semana foi constatado 381 kg, observou-se na terceira semana uma redução para 307 kg, já na quarta semana obteve aumento para 410 kg e na quinta semana diminui para 151 kg de lixo infectante (seringas, agulhas, ataduras, gases, cateteres, sondas, curativos e materiais de coleta de exames), obtendo um total de 1.477,5 kg. No período da pesquisa constatou-se que o município de Catolé do Rocha – PB, necessita de incinerador ambientalmente correto, pois o lixo coletado no hospital é levado para a capital João Pessoa – PB, a uma distância de mais de 500 km, onde são incinerados os resíduos sólidos gerados na unidade de saúde.

**Palavras-chave** - Meio ambiente. Resíduos sólidos. Contaminação.

## **QUANTIQUALITATIVE DIAGNOSIS OF GARBAGEIN HOSPITAL PATHOGENIC REGIONAL DECATOLÉ DO ROCHA-PB**

**ABSTRACT** - The objective of this work was to make a survey of the pathogenic quanti trash Regional Hospital Dr. Americo Maia de Vasconcelos located in Catolé do Rocha - PB . The survey was conducted from 01 à 31/05/2012 , which involved the entire hospital community , such as nursing assistants and technicians , nurses , x-ray technician , social worker , medical , archivists and faturistas , typists , physiotherapists , nutritionists , porter and janitor and general assistant and gardeners , from collection to the daily weighing of such waste which has high risk to humans and the environment . During the month of the survey on the drive there was great concern the administration with all employees , including those who have access to garbage . The weighing of the first week got 228.5 kg , the second week was found 381 kg , we observed a reduction in the third week to 307 pounds, already in its fourth week has increased to 410 kg and in the fifth week decreases to 151 kg of garbage infective ( syringes , needles , bandages , gases , catheters , probes , curative and sample collection materials ) , obtaining a total of 1477.5 kg . During the study period it was found that the municipality Catolé do Rocha - PB , requires environmentally friendly incinerator because the waste collected is taken to hospital in the capital João Pessoa - PB , at a distance of more DE500 km , where they are incinerated solid waste generated in the health unit .

**Keywords** - Environment .Solidwaste .Contamination.

## 1 .INTRODUÇÃO

O lixo hospitalar tem grande risco de contaminação que prejudica os seres humanos e o meio ambiente, totalmente diferente dos outros tipos de lixo, merece cuidado especial desde sua coleta até a incineração.

Considerando que os sistemas de tratamento térmico de resíduos são fontes potenciais de risco ambiental e de emissão de poluentes perigosos que constitui agressão à saúde e meio ambiente se não forem corretamente instalados, operados e mantidos pela (CONAMA et al.2012).

Diversos problemas ambientais existentes mundialmente, o dos resíduos sólidos urbanos torna-se um dos maiores desafios da atualidade. Através do acelerado avanço tecnológico e o crescimento habitacional ocorrem incremento na produção de bens e serviços. Entretanto, à medida que são produzidos e consumidos, acarretam uma geração cada vez maior de resíduos, os quais, quando dispostos inadequadamente, trazem significativos impactos à saúde pública e ao meio ambiente.

De acordo com Guerra(2009)os riscos ambientais são resultantes da associação de riscos decorrentes de processos naturais agravados pelas atividades humanas e pela ocupação do território.

A alta produção de resíduos sólidos, a destinação inadequada destes constitui fator preocupante, contribuindo para a poluição do solo, do ar e dos lençóis freáticos. A maior parte dos resíduos sólidos produzidos é de caráter orgânico, tais como: restos de comida, cascas de frutas e verduras, sementes, além de folhas e galhos de árvores provenientes de poda, dentre outros, (SILVA et al; 2010).

Segundo Besenetal. (2010) a gestão e disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais, tais como: degradação do solo, comprometimento dos corpos d'água e mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para poluição do ar e proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos e catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final.

Princípio de precaução e sustentabilidade significa impulsionar mudanças e adotar atitudes precavidas, sustentáveis. Todavia, o alcance destes objetivos, só será possível por meio de um processo contínuo e permanente de educação ambiental, constituindo um processo educativo que ocorre a partir da realidade ambiental, buscando a construção de conhecimento, compreensão das leis naturais, mudanças de percepção e de valores, soluções e ações sustentáveis (SILVA et al.,2009).

O Brasil conta com um marco para a criação de possíveis iniciativas públicas com relação aos resíduos sólidos, a Lei de Saneamento Básico. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, disciplina a coleta, o destino final e o tratamento de resíduos urbanos, perigosos e industriais, entre outros, além de estabelecer que os estados e municípios têm até agosto de 2012 para elaborar seus Planos de Resíduos Sólidos e continuar ter acesso aos recursos do Governo Federal, na área de resíduos e que os mesmos possuem o período de agosto de 2014 para eliminar lixões e implantar aterros sanitários, que receberão apenas rejeitos.

A Paraíba está entre os estados que pior tratam os resíduos sólidos, cerca de 70% do lixo é jogado em lixões, excetuando a cidade de João Pessoa que possui um aterro sanitário (ALCÂNTARA, 2011).

De acordo com Bravo (2011) a educação ambiental crítica tem como ponto de partida o real concreto dos sujeitos e embalada por ideais democráticos e participativos, visando contribuir para mudança de valores e atitudes frente ao mundo, tornando como palco de relações socioambientais em disputa, em construção. Através da conscientização, sensibilização e reflexão, a educação deve ser vista como uma possibilidade de mudança das relações sociais, de edificação de valores mais solidários e de valorização de práticas contrárias a competição exacerbada e ao consumo desmedido (LOPES; SOSSAE, 2010).

De acordo com as normas da resolução do CONAMA pode perceber que no hospital regional de Catolé do Rocha – PB possui um órgão interno responsável para mostrar aos funcionários vários riscos que o lixo trás, essa comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) é responsável pelas medidas para ensinar e fiscalizar de forma padronizada a maneira correta, de controle da coleta do lixo hospitalar.

Tendo em vista o descaso com os resíduos sólidos por parte dos governos municipal, estadual e federal no Brasil e no mundo, especialmente com os resíduos patogênicos, faz-se necessário a realização dessa pesquisa, para averiguar a quantidade, qualidade e se os resíduos patogênicos do Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos localizado no município de Catolé do Rocha – PB tem destino final ecologicamente correto como manda a lei, pelo fato de se tratar de resíduos altamente perigosos pra saúde dos seres vivos, inclusive humanos e do meio ambiente.

Diante o exposto, objetivou-se com esta pesquisa realizar um levantamento quanti qualitativo do lixo patogênico produzido no Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos, localizado no município de Catolé do Rocha – PB.



## **2 .MATERIAIS E MÉTODOS**

### **2.1 . Localização da Pesquisa.**

A pesquisa foi realizada no Hospital Regional Drº. Américo Maia de Vasconcelos, localizado na rua Castelo Branco, S/N no bairro Batalhão na cidade de Catolé do Rocha - PB,cujas coordenadas geográficas são 6º 20' 38" de Latitude Sul e 37º 44' 48" a Oeste do meridiano de Greenwich uma altitude de 275m acima do nível do mar (Figura 1).



**Figura 1**–Hospital Regional Drº. Américo Maia de Vasconcelos, Catolé do Rocha – PB, ano 2014.

### **2.2 . Quadro de Funcionários do Hospital.**

A unidade funciona com um grande quadro de funcionários como: 21 auxiliares e técnicos de enfermagem, 20 enfermeiros, 06 técnicos de raio-x, 04 assistente social, 17 médicos,03 farmacêuticos e 02 auxiliares de farmácia,04 fisioterapeutas, 02 nutricionistas, 01 jardineiro,06 motoristas, 05 porteiros e 05 maqueiros,14 auxiliares de serviços gerais,07 recepcionistas, 01 artífice, 02 digitadores,04 faturistas,01 arquivista, 02 financeiro, 01 diretor, 01 recursos humanos, 01 administrador, um total de 130 funcionários.

### **2.3. Coleta e Destino Final do Lixo Hospitalar.**

A coleta e posterior pesagem do lixo diariamente, e em seguida conduzido para um aterro sanitário onde é devidamente incinerado. O transporte é feito, através de um veículo preparado e bem fechado (carro furgão). Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado luvas longas de borracha, máscara com filtros e jaleco, todos fornecidos pela unidade de saúde citada (Figura 2 A, B e C)



Foto: Francisco Edimício Maia

**Figura 2** - Retirada do lixo para pesagem (A). Realização da pesagem do lixo (B) e fazendo anotações das análises (C).

#### **2.4. Cartilha: Planeta mais Limpo.**

Para começar a pesquisa foi confeccionado uma cartilha, informativa mostrando os danos do lixo patogênico, para os funcionários que trabalha diretamente com o lixo hospitalar da unidade. É uma pesquisa capaz de identificar os danos que o lixo tem se não fossem corretamente tratados, riscos esses não somente com o ser humano mais com o meio ambiente.

### **3. RESULTADOS E DISCUSSÃO**

Podemos perceber que os resíduos perfuro cortantes produzidos no Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos em Catolé do Rocha – PB, possui destino correto. Todo lixo produzido na unidade de saúde é disposto em caixas e sacos que são aprovadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), onde são espalhados em vários setores como posto de atendimento interno, enfermarias, sala de vacina, esterilização, sala de parto, bloco cirúrgico, urgência e emergência entre outros. Esse lixo é coletado diariamente no final de cada expediente de trabalho, por se trata de um hospital de muitos atendimentos, geralmente são utilizadas a troca das caixas duas vezes ao dia, pela manhã e no final da tarde, logo depois de coletado o lixo fica disposto em tambores de borracha e bem vedados, até que os coletores venha buscá-lo. A coleta foi feita duas vezes no mês por coletores que se deslocam da capital João Pessoa – PB, em um veículo tipo caminhão furgão, onde o lixo é levado com destino correto para incineração.

O destino do lixo produzido no hospital regional não é preocupante, mas outras unidades de saúde da cidade e de municípios vizinhos não sabemos como é feita a coleta, pois se trata de órgãos municipais em que o estado não tem compromisso de fazer coleta. O ideal seria a construção de um aterro sanitário na região de Catolé do Rocha - PB, por se tratar de ser sede da 8ª região da Paraíba, onde várias cidades são polarizadas.

Os resultados obtidos nas pesagens semanais encontram-se nas tabelas, onde tivemos valores correspondentes em comparação a outros trabalhos.

De acordo com os dados da tabela 1, os resíduos do grupo A (risco biológico), foram mais produzidos compreendendo um percentual de 53,9%. Esses materiais são de grande risco para os seres humanos e meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos, como materiais cirúrgicos e sangue. Esses resíduos devem ser acondicionados em sacos plásticos resistentes e identificados simbologia infectante. Já o grupo E apresentou um percentual de 46,1%, esses materiais são de risco por se tratar de lixo cortante como agulhas, bisturi entre outros, esses devem ser descartados separadamente.

**Tabela 1** - Produção de Resíduos Sólidos de Saúde gerados no Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos- Catolé do Rocha - PB, levando em consideração os resíduos do grupo A (risco biológico) e grupo E (perfuro cortantes) primeira semana. UEPB, Catolé do Rocha – PB, 2014.

<b>Magnitude</b> <b>Parâmetro</b>	<b>Kg/semana</b>	<b>Porcentagem (%)</b>
Grupo A	123,3	53,9
Grupo E	105,2	46,1
<b>TOTAL</b>	<b>228,5</b>	<b>100</b>

Analisando os dados expostos na tabela 2, verificou-se que o resíduo mais gerado na segunda semana foi o do grupo A com um percentual de 60,6%.

**Tabela 2** - Produção de Resíduos Sólidos de Saúde gerados no Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos- Catolé do Rocha - PB, levando em consideração os resíduos do grupo A (risco biológico) e grupo E (perfuro cortantes)segunda semana.UEPB, Catolé do Rocha – PB, 2014.

<b>Magnitude</b> <b>Parâmetro</b>	<b>Kg/semana</b>	<b>Porcentagem (%)</b>
Grupo A	230,9	60,6
Grupo E	150,1	39,4
<b>TOTAL</b>	<b>381</b>	<b>100</b>

Verificando os dados da tabela 3, constatou-se mais uma vez, que o material do grupo A gerados na unidade de saúde na terceira semana foi o mais produzido com um percentual de 55,8%.

**Tabela 3** - Produção de Resíduos Sólidos de Saúde gerados no Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos- Catolé do Rocha - PB, levando em consideração os resíduos do grupo A (risco biológico) e grupo E (perfuro cortantes) terceira semana.UEPB, Catolé do Rocha – PB, 2014.

<b>Magnitude</b> <b>Parâmetro</b>	<b>Kg/semana</b>	<b>Porcentagem (%)</b>
Grupo A	171,6	55,8
Grupo E	135,4	44,2
<b>TOTAL</b>	<b>307</b>	<b>100</b>

Examinando os resultados da tabela 4, observou-se que na quarta semana do mês foi a que mais produziu material do grupo A e E, chegando a um valor total de 410 Kg de material produzido na unidade.

Os resíduos do grupo A apresentaram um percentual de 55,1% esse material apresenta grande risco, o material do grupo E, obteve um percentual de 44,9% de lixo perfurocortante.

**Tabela 4** - Produção de Resíduos Sólidos de Saúde gerados no Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos- Catolé do Rocha - PB, levando em consideração os resíduos do grupo A (risco biológico) e grupo E (perfuro cortantes) quarta semana.UEPB, Catolé do Rocha – PB, 2014.

<b>Magnitude</b> <b>Parâmetro</b>	<b>Kg/semana</b>	<b>Porcentagem (%)</b>
Grupo A	226	55,1
Grupo E	184	44,9
<b>TOTAL</b>	<b>410</b>	<b>100</b>

Avaliando os dados da tabela 5, que corresponde a quinta semana do mês foi a que menos produziu material, chegando a um valor total de 151 Kg de lixo produzido na unidade, o grupo A obteve um percentual de 63,1%, e o do grupo E, 36,9%.

**Tabela 5** - Produção de Resíduos Sólidos de Saúde gerados no Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos- Catolé do Rocha - PB, levando em consideração os resíduos do grupo A (risco biológico) e grupo E (perfuro cortantes) quinta semana.UEPB, Catolé do Rocha – PB, 2014.


<b>Magnitude</b> <b>Parâmetro</b>	<b>Kg/semana</b>	<b>Porcentagem (%)</b>
Grupo A	95,3	63,1
Grupo E	55,7	36,9
<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>100</b>

De acordo com dados expostos nas tabelas apresentadas chegamos a um valor total de 1.447,5 Kg de lixo do grupo A e E produzidos no Hospital de Catolé do Rocha-PB, lembrando que os materiais de risco radioativo não ficam na unidade são levados para João Pessoa – PB, onde lá são apresentados a médicos para serem fornecidos laudos médicos.

Os resultados apresentados no gráfico 1 confirmam que a unidade de saúde produzem 1.477,5 Kg de lixo do grupo A e E, isto é, se não fosse descartado corretamente poderiam produzir grandes impactos a sociedade e ao meio ambiente.

Podemos comprovar que na quarta semana obteve - se um valor de 28% do lixo coletado no hospital regional durante o mês de maio de 2012.

### PESAGEM DO LIXO POR SEMANA %



**Gráfico 1** - Pesagem de lixo por semana (%) no Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos em Catolé do Rocha – PB, 2014.

Silva (2008), trabalhando com resíduos sólidos patogênicos no Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio no município de São Bento – PB chegou a resultados muito baixos em comparação com a 4ª semana do mês pesquisado neste trabalho que mais produziram resíduos, sendo um total de 410 Kg produzidos no Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos na cidade de Catolé do Rocha-PB.

Os resíduos do grupo A (risco biológico) produzidos na unidade hospitalar Maria Paulino Lucio obteve um percentual de 30% em comparação com a unidade hospitalar Dr. Américo Maia que na 4ª semana obteve um percentual de 55,1%, sendo que as duas unidades de saúde juntas somam um percentual de 85,1%, um número relativamente muito alto sabendo que esse tipo de resíduo é muito perigoso não podendo ser descartado como o comum, sem falar nas outras unidades de saúde das cidades vizinhas.

Já os resíduos do grupo E (perfurocortantes) na unidade Maria Paulino Lucio obteve um percentual de apenas 7%, um número muito baixo em relação a 4ª semana que mais produziu resíduos sólidos do hospital Américo Maia que chegou a um percentual de 44,8% de lixo perfurocortante.

Com esses resultados podemos perceber que o Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos em Catolé do Rocha é o que mais produz resíduos do grupo A (risco biológico) e grupo E (perfurocortantes), pois se trata de uma unidade que atende toda região diariamente com consultas ambulatoriais, urgência e emergência e cirúrgicas, chegando a um total de 3.000 atendimentos no mês, com isso é de grande preocupação, pois esse lixo produzido na unidade hospitalar de Catolé do Rocha tem destino correto, visto que, é incinerado em João

Pessoa-PB, mais as outras unidades de saúde da região não descartam esse lixo de forma correta lembrando que na nossa região foi inaugurado um novo hospital na cidade de Belém de Brejo do Cruz – PB, o qual a tendência é só aumentar a produção de lixo hospitalar na região e descartado de forma inadequada.

#### 4 .CONCLUSÕES

1. Temos que Conscientizar a população sobre os riscos que o lixo trásao ser descartado inadequadamente;
2. O lixo infectante que causa sérios danos a saúde humana e ao meio ambiente;
3. Aeducação ambiental foi de grande importância para os funcionários que trabalham no setor hospitalar;
4. Construção de um aterro sanitário na micro região polarizada por Catolé do Rocha / PB, para acondicionar resíduos sólidos da região.

#### AGRADECIMENTOS

Agradecemos principalmente ao grande criador Deus por ter nos dado a oportunidade da realização dessa pesquisa e a Universidade Estadual da Paraíba em nome da Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Fabiana Xavier Costa pelo apoio e paciência.

#### 5 .REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ABRELPE. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, 2010**. Disponível em: <<http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2010.pdf>>. Acesso em: 23 jul. 2013.

ALCÂNTARA, Dércio. Reportagem: **Cerca de 70% dos resíduos sólidos na Paraíba ainda são jogados em lixões**. Disponível em: <http://www.dercio.com.br/blog/cerca-de-70-dos-residuos-solidos-na-paraiba-ainda-/2011>. Acesso em: 23 nov. 2013.

BARCELLOS, C. Quem sustenta tanto desenvolvimento? **Revista Ciência e Saúde Coletiva**. Rio de Janeiro-RJ, v.14, n.6, 2009.

BRAVO, M.D. Construindo alternativas à crise socioambiental contemporânea: Educação Ambiental crítica, transformadora e emancipatória e história oral. **Revista Eletrônica Mestrado de Educação Ambiental**. Rio Grande do Sul, v.26, 2011.

BESEN, G.R.etal.ResíduosSólidos:vulnerabilidades e perspectivas.In:SALDIVA,P.etal.**Meio ambiente e saúde:o desafio das metrópoles**.SãoPaulo:ExLíbris,2010.

(CONAMA) RESOLUÇÃO Nº 316, DE 29 DE OUTUBRO DE 2012. Resolução CONAMA Nº 316/2012 - Ministério do Meio Ambiente.

DEBONI, F; MELLO, S.S.de; TRAJBER, R. Coletivos jovens de Meio Ambiente e Com-Vida na Escola: a geração do futuro atua no presente. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**. Cuiabá, n.4, 2009.

FELIX, Rozeli Aparecida Zanon. Coleta seletiva em ambiente escolar. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**. ISSN 1517-1256, v.18, janeiro a junho de 2007.

GONZALES, L.T. V; TONZONI-REIS, M.F. C; DINIZ, R.E.S. Educação ambiental na comunidade: uma proposta de pesquisa-ação. **Revista Eletrônica Mestrado em Educação Ambiental**, Rio Grande do Sul, v.18, 2007.

GUERRA, S.A Crise Ambiental na Sociedade de Risco. **Lex Humana**. Petrópolis-RJ, v.1, n.2, 2009.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2009). Disponível:<<http://noticias.ambientebrasil.com.br> >.Acesso em: 23 Julho de 2013.

Informações baseadas em dados obtidos pelo IBGE (CENSO 2010).

LOPES, T.M; SOSSAE, F.C. Educação Ambiental na EMEF prof.Luís Roberto Salinas Fortes no município de Araraquara (SP);um estudo de caso. **Revista Eletrônica Mestrado de Educação Ambiental**. Rio Grande do Sul, v.25, 2010.

MAIA, K. M. **Impactos Ambientais Causados Pelo Destino do Lixo Patogênico das Unidades de Saúde de São Bento-PB**: Um Enfoque Sustentável. Monografia de conclusão de curso, Graduação em Ciências Agrárias, Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do Rocha, PB, 2009.

MELO FILHO, J.S; COSTA, F.X; VERAS, M.L, M; SILVA, L.P; DANTAS, V.A. Caracterização dos Resíduos Sólidos Gerados no Cemitério de Catolé do Rocha-PB, Após o dia de finados. **In: VIII Encontro Nacional de Licenciatura Plena em Ciências Agrárias\VI Semana de Licenciatura em Ciências Agrárias**, Catolé do Rocha-PB. Currículo, Identidade e Trabalho. Campina Grande: Realize Eventos Científicos LTDA, 2011, p.246-252.

OLIVEIRA, T.P.de; LEMOS R.M. Promovendo a educação ambiental como instrumento de aprendizagem nas escolas no município de Iguai, Bahia- **Revista Eletrônica Mestrado de Educação Ambiental**. Rio Grande do Sul, v.26, 2011.



SILVA, M.M.P.daetal.Avaliação sanitária de resíduos sólidos orgânicos domiciliares de municípios do semiárido paraibano.**Revista Caatinga**,Mossoró,v.23,n.2,2010.

SILVA, M.M.P.daetal.EducaçãoAmbiental;Instrumento para sustentabilidade de Tecnologias para tratamento de Iodos de esgotos. **Revista Eletrônica Mestrado de Educação Ambiental**. Rio Grande do Sul, v.23, 2009.

SILVA, M.do S.F.da; JOIA, P.R. Educação ambiental: a participação da Comunidade na Coleta seletiva de resíduos sólidos. **Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros**. Seção Três Lagoas, n.7, 2008.